

インフルエンザ予防接種予診票

新

受付 会計 接種
() () ()

※接種希望の方へ：太枠の中をご記入下さい。
※お子さんの場合には、健康状態をよく把握している保護者をご記入下さい。

住所	〒 _____ TEL() _____	診察券番号
(フリガナ)	()	性別
受ける人の名前	男・女	生年月日
保護者署名 接種者が未成年者の時		大・昭・平・令 年 月 日
		歳
		ヶ月

質問事項	回答欄	
現在の年齢で該当する欄に○をつけてください。 6ヶ月～2歳 ・ 3歳～64歳 ・ 65歳以上 ※65歳以上の方は水色の公費専用の問診票をご利用ください	体温	℃
1. 今日受ける予防接種の説明：裏面を読んで理解しましたか。	いいえ	はい
2. 今日受けるインフルエンザ予防接種は	2回目 (1回目接種日 /)	1回目
3. 今日、具合の悪いところがありますか。 または1ヶ月以内に病気にかかりましたか	ある(具体的に)	ない
4. 1ヵ月以内に麻疹・風疹・水痘・おたふくかぜにかかった方とよく一緒にいましたか。 ※潜伏期間が2-3週間あるため、その場合は効果が出ないことがあるのでお勧めしません	はい	いいえ
5. 現在、何かの病気にかかっていますか。	はい(病名) 薬を飲んでいますか(いる・いない)	いいえ
6. 初回の熱性けいれんを、8週間以内に起こしましたか。 ※8週間以内に初回のけいれん発作があった場合は当院では接種できません	はい	いいえ
7. 薬や食品(鶏肉、鶏卵など)、予防接種で具合が悪くなったことがありますか。	ある(薬または注射名)	ない
8. 4週間以内に何かの予防接種を受けましたか。接種日 /	はい 予防接種名：	いいえ
9. 医師に、予防接種を控える様に言われたことはありますか？	ある	いいえ
10. 6ヵ月以内にガンマグロブリンの点滴を受けましたか。 ※投与されている場合は効果が出ないことがあるため、当院では接種できません	はい	いいえ
11. <妊娠中の女性のかたへ> インフルエンザワクチンの副作用に比較して、妊娠中にインフルエンザにかかることに伴う胎児への が大きいと、ワクチン接種による予防が大切である事をご理解されましたか。 その他、健康状態のことで医師に伝えておきたいことがあれば 具体的に書いて下さい。		はい

★12歳までのお子さんは2-4週間後に2回目の接種を受けることをお勧めします。
★初めての離乳食・歯磨き教室開催中です。詳細は電話にてお問い合わせください。
★ワクチンを打つ前に接種部位を保冷剤で冷やすことで、接種時の痛みの軽減が期待できます。 **全ての質問にチェック**
ご利用の方はご家庭から小さめの保冷剤をご持参下さい。 **できましたか？ □ はい**

使用ワクチン名	用量	医師名・接種日時
インフルエンザHAワクチン	<input type="checkbox"/> 0.25ml (6ヶ月～2歳) <input type="checkbox"/> 0.5ml (3歳以上)	医師名：溝口(哲) 溝口(優) 福澤 藤山・辻村・坂口・大瀧・柳澤
Lot No.	用法：皮下接種 12歳までは2回接種	接種日時：R

* 接種可能な人のみ医師名に○をつける
実施場所：静岡県袋井市浅岡45-1
0538-23-8300
溝口ファミリークリニック
Mallampati分類 III・IV

インフルエンザワクチンの接種について

インフルエンザの予防接種を実施するに当たって、受けられる方の健康状態をよく把握する必要があります。そのため、表面の予診票に出来るだけ詳しくご記入ください。お子さんの場合には、健康状態をよく把握している保護者がご記入下さい。

[ワクチンの効果と副反応]

予防接種により、インフルエンザ感染を予防したり、症状を軽くすることができます。また、インフルエンザによる合併症や死亡を予防することが期待されます。

一方、副反応は一般的に軽微です。注射部位が赤くなる、腫れる、硬くなる、熱をもつ、痛くなるがありますが通常は2〜3日で消失します。発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、一過性の意識消失、めまい、リンパ節腫脹、嘔吐、下痢などもまれに起こります。強い卵アレルギーのある方は強い副反応を生じる可能性がありますので必ず医師に申し出て下さい。非常にまれですが、次のような副反応が起こることがあります。(1)ショック、アナフィラキシー様症状(蕁麻疹、呼吸困難など)、(2)急性散在性脳脊髄炎(接種後数日から2週間以内の発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害など)、(3)ギラン・バレー症候群(両手足のしびれ、歩行障害など)、(4)肝機能障害、黄疸、(5)喘息発作。このような健康被害が生じた場合の救済については、健康被害を受けた人又は家族が独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づいて手続きを行うことになります。

[予防接種を受けることができない人]

1. 明らかに発熱のある人(37.5℃を超える人)
 2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
 3. 過去にインフルエンザワクチンの接種を受けて、アナフィラキシーを起こしたことがある人
- なお、他の医薬品投与を受けてアナフィラキシーを起こした人は、接種を受ける前に医師にその旨を伝えて判断を仰いで下さい。
4. その他、医師が予防接種を受けることが不相当と判断した人

[予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなければならない人]

1. 心臓病、腎臓病、肝臓病や血液の病気などの人
2. 発育が遅く、医師、保健師の指導を受けている人
3. カゼなどのひきはじめと思われる人
4. 予防接種を受けたときに、2日以内に発熱、発しん、じんましんなどのアレルギーを疑う異常がみられた人
5. 薬の投与又は食事(鶏卵、鶏肉など)で皮膚に発しんが出たり、体に異常をきたしたことがある人
6. 今までにけいれんを起こしたことがある人
7. 過去に本人や近親者で検査によって免疫状態の異常を指摘されたことがある人
8. 妊娠の可能性のある人
9. 気管支喘息のある人

[ワクチン接種後の注意]

1. インフルエンザワクチンを受けたあと30分間は、急な副反応が起きることがあります。医療機関にいるなどして、様子を観察し、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。
2. 接種当日の入浴は差し支えありませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
3. 接種当日は、接種部位を清潔に保ちましょう。注射した部位をこすことはやめましょう。
4. 万一、高熱やけいれん等の異常な症状が出た場合は、速やかに医師の診察を受けて下さい。